CO2 激光（痣 | 扁平疣 | 脂肪粒 | 皮脂腺增生）

[恢复过程]

- 施术部位会出现泛红以及结痂，通常会在1-2周内会自然脱落。
- 结痂脱落后可能会留下红色印记，并会随时间逐渐变淡。
- 如果治疗后色素再次出现，可以在前次治疗结束日起1-3个月后进行再次治疗。考虑到皮肤的正常再生及恢复周期，大多数情况下建议约3个月后再次治疗。

CO2 激光（痣 | 扁平疣 | 脂肪粒 | 皮脂腺增生）

[术后护理]

- 贴上再生贴后，伤口部位可能会产生渗出液，这是正常的恢复过程。待渗出液完全吸收后再取下再生贴，有助于伤口愈合。当渗出液向外渗出时才需更换再生贴，其他情况下请等待渗出液完全吸收后再取下。此后，建议约一周内每1-2天更换一次再生贴，若再生贴被污染也需及时更换。
- 极少数情况下可能出现对再生贴本身的过敏反应。若发生这种情况，请取下再生贴后，根据医护人员指导，涂抹类固醇药膏或抗生素药膏约1-2周进行护理。同时，为预防该部位色素沉着，需要比平时更频繁地涂抹防晒霜。
- 再生贴具有生活防水功能，洗脸、化妆、淋浴时请贴着再生贴进行生活。
- 取下再生贴后，请涂抹修复霜及防晒霜。
- 术后一周内请避免按摩、汗蒸房、桑拿、剧烈运动、饮酒和吸烟，并暂停使用去角质产品、磨砂膏、刷酸类产品。请轻柔洁面。