CO2 (점 | 편평사마귀 | 비립종 | 피지선 증식증 제거)

[경과]

- 시술 부위에 붉은기와 딱지가 생기며, 보통 1~2주 이내에 자연스럽게 떨어집니다.
- 딱지가 떨어진 후에 붉은 자국이 남을 수 있으나 점차 옅어집니다.
- 시술 후 색소가 재발하는 경우, 이전 시술로부터 1~3개월 경과 후 재시술이 가능합니다. 피부의 정상적인 재생 및 회복 기간을 고려하여, 대부분의 경우 약 3개월 후 재시술을 권장합니다.

CO2 (점 | 편평사마귀 | 비립종 | 피지선 증식증 제거)

[관리]

-재생밴드 부착 후 상처 부위에서 삼출물이 발생할 수 있으며, 이는 정상적인 회복 과정입니다. 삼출물이 완전히 흡수된 후 재생밴드를 제거하는 것이 상처 회복 및 치유에 도움이 됩니다. 진물이 외부로 새어 나오는 경우에만 재생밴드를 교체하시고, 그 외에는 삼출물이 모두 흡수된 후 제거해 주시기 바랍니다. 이후에는 약 1주일 동안 1~2일 간격으로 재생밴드를 교체하는 것을 권장드리며, 듀오덤 등 재생밴드가 오염된 경우에도 교체가 필요합니다.
- 드물게 듀오덤(재생밴드) 자체에 대한 알레르기 반응이 나타날 수 있습니다. 이러한 경우 듀오덤을 제거한 후, 의료진의 안내에 따라 스테로이드 연고 또는 항생제 연고를 약 1~2주간 도포하여 관리해 주시기 바랍니다. 또한 해당 부위의 색소 침착 예방을 위해 자외선 차단제를 평소보다 더 자주 발라주시는 것이 필요합니다.
- 생활 방수가 되니 세안, 화장, 샤워 꼭 재생밴드를 붙이고 생활해주세요.
- 재생밴드를 제거하고 재생 크림과 선크림을 꼭 발라주세요.
- 일주일 동안 마사지, 찜질방, 사우나, 격한 운동, 음주, 흡연을 피해주시고 각질 제거, 스크럽, 필링을 자제해주세요. 세안은 부드럽게 해주세요.