필러 | 실리프팅

[경과]

- 시술 후 붓기, 멍, ,이물감, 주사 자국, 당김, 욱신거리는 통증이 생길 수 있으며, 개인차가 있으나 보통 3~7일 내 호전됩니다.
- 시술 후 울퉁불퉁 또는 비대칭 / 과한 볼륨, 당김이 느껴지실 수 있습니다. 1~2주 동안 자리 잡으면서 자연스러워집니다
- 실리프팅 후 얼굴 근육을 움직일 때 실이 삽입된 부위에 통증이 있을 수 있습니다.
- 시술 후 피부색 변화, 수포(여드름처럼 올라올 수 있음), 극심한 통증, 멍이 장기간 지속되는 경우 또는 실이 밖으로 튀어나오는 증상이 나타날 경우에는 즉시 병원으로 연락해 주시기 바랍니다.

[관리]

- 시술 부위를 강하게 누르거나 문지르는 것을 피해주세요.
- 일주일 동안 마사지, 찜질방, 사우나, 격한 운동, 음주, 흡연을 피해주세요.
- 통증 및 염증 예방을 위해 처방한 약을 꼭 복용해주세요.
- 엎드려 자거나 모양이 변형될 수 있는 자세, 모자, 선글라스는 피해주세요.
- 실리프팅 후 입을 너무 크게 벌리지 마시고, 세안하실 땐 부드럽게 해주세요.